

Konsentrasi Pestisida pada Sedimen dan Air Laut dan Kaitannya dengan Komunitas Benthik di Perairan Pantai Mlonggo Jepara

Baskoro Rochaddi dan Chrisna Adhi Suryono

Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang

Abstrak

Senyawa pestisida merupakan senyawa persisten yang sangat sulit diuraikan dan akan terakumulasi dalam lemak suatu organisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan senyawa pestisida dan keterkainya dengan keanekaragaman makrozoobenthos di perairan Mlonggo Jepara. Metode survey digunakan dalam penelitian ini dengan mengambil 3 lokasi titik sampling dan ulangan sebanyak 4 kali. Hasil penelitian menunjukkan daerah muara sungai (stasiun II) menunjukkan kandungan pestisida yang lebih tinggi dan keanekaragaman hewan makrozoobenthos yang rendah bila dibandingkan dengan stasiun I (perairan sungai) dan stasiun III (perairan laut).

Kata kunci: *Pestisida, akumulasi dan makrozoobenthos*

Abstract

The pesticide compound has characteristic difficult to degrade in the nature and accumulate in fat tissue of organism. The purpose of the research was conducting the existing of pesticide compound on Mlonggo waters and their correlation to macrozoobenthic diversity. Sampling survey method was applied on this research which take place on 3 station and 4 replicate. The present research show, that the location on the mouth of river (station II) has the highest concentration of pesticide compound and lowest of macrozoobenthic diversity compared with stations I and III which located on the river and sea.

Keywords: *Pesticide, accumulation and macrozoobenthic*

Pendahuluan

Daerah pesisir pantai Mlonggo yang sebagian besar garis pantainya dipergunakan untuk intensifikasi budidaya pertanian memungkinkan pencemaran garam-garam dari berbagai senyawa halogen yang disebabkan oleh meningkatnya penggunaan bahan pestisida, herbisida, dan insektisida di dalam bidang pertanian. Polutan-polutan tersebut dapat menyebabkan tidak berfungsinya dan menurunnya kualitas lingkungan yang sangat

merugikan bagi keseimbangan ekosistem organisme laut di perairan pantai tersebut. Senyawa pestisida organoklorin merupakan senyawa persisten yang sangat sulit diuraikan di alam dan akan terakumulasi dalam lemak suatu organisme. Senyawa tersebut bersifat karsinogen dan mutagen terhadap hewan (Sutamihardja, 1991). Pencemaran garam-garam dari berbagai senyawa halogen pada perairan Pantai Mlonggo yang disebabkan oleh meningkatnya penggunaan bahan pestisida,

herbisida dan insektisida di dalam bidang pertanian, menyebabkan tidak berfungsinya dan menurunnya kualitas lingkungan yang sangat merugikan bagi keseimbangan ekosistem perairan pantai.

Djajanto (1985) mengatakan bahwa 12 jenis pestisida yang dikategorikan '*extremely*' atau '*highly*' toksik bagi manusia maupun lingkungan oleh WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), 8 jenis di antaranya dipasarkan di Indonesia, yaitu, HCH atau Lindane, Chlordane atau Heptachlor, DDT, Aldrin (Dieldrin dan Endrin), Paraquat, Parathion, EDB dan 2,4,5 T. Meningkatnya jenis dan volume penggunaan senyawa-senyawa kimia tersebut di Indonesia tidak lepas dari pencanangan program rehabilitasi perkebunan pada tahun 1960 (Djamin, 1983) dan program revolusi hijau ('*green revolution*') melalui Panca Usaha Pertanian pada tahun 1970 oleh pemerintah (Anonim, 1987). Sehingga perlu dievaluasi kembali data tentang toksisitas pestisida dan dampaknya terhadap lingkungan. Adanya residu pestisida organoklorin pada sedimen dan air laut diduga akan mempengaruhi kehidupan dan keanekaragaman makrozoobenthos yang berada di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kualitas perairan pantai Mlonggo dengan mendeteksi keberadaan senyawa pestisida organoklorin pada sedimen dan air laut, keanekaragaman makrozoobenthos.

Materi dan Metoda

Materi

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel sedimen yang diambil dari perairan Mlonggo kemudian dianalisa kandungan pestisida, hewan makrobenhos, dan kandungan bahan organik. Sedangkan untuk sampel air dianalisa besarnya kadargaram, suhu, dan oksigenterlarut.

Metoda

Sampling

Sampling sedimen dan air laut dilakukan secara '*stratified random*' pada 3 stasiun yang ditentukan dengan jarak masing-masing 0, 500 dan 1000 meter dari tengah estuaria kearah laut dengan bottom sampler grab dan botol nansen.

Analisis Makrozoobenthos

Sampel sedimen yang diperoleh diayak dengan saringan 0.5 mm guna memisahkan substrat dan kotoran. Sampel benthos yang diperoleh kemudian diawetkan dengan formalin 4% dan beberapa tetes rose bengale. Identifikasi dilakukan di laboratorium dengan menggunakan buku kunci identifikasi Robert *et al.* (1982).

Analisis Residu Pestisida Organoklorin

Analisis residu organoklorin akan dilakukan menurut prosedur yang dilakukan oleh Hamidah (1994).

a. Sampel air

Sampel air laut sebanyak 50 liter disaring dengan menggunakan filter '*glass fiber*' dengan diameter 293 mm. Hasil saringan diekstrak

dengan n-hexana selama 4 jam dengan menggunakan alat 'liquid-liquid extractor, kemudian destilatnya diuapkan dengan Kuderna Danish sampai volume mencapai 1 ml.

Tahap berikutnya dilakukan 'clean up' yang berguna untuk menghilangkan senyawa-senyawa lainnya yang mengganggu, dengan cara memberikan Al_2O_3 yang dilewatkan dalam n-hexana. Setelah itu dilakukan dengan proses pemisahan fraksi yang kurang polar (P1) dan lebih polar (P2) dengan cara melewatkan n-hexana kedalam botol yang berisi dilika untuk P1, dan penambahan 10% etil dalam n-hexana untuk mendapatkan P2. Selanjutnya kadar pestisida organoklorin diukur dengan alat Gas Chromatography.

b. Sampel sedimen

Sampel sedimen diambil dengan menggunakan grab dan disimpan dalam botol kaca yang tutupnya dilapisi alumunium foil. Kemudian dari sampel, diambil sebanyak 40-50 gram dan dipanaskan dalam oven dengan suhu 50oC selama 24 jam. Selanjutnya dilakukan penambahan Na_2SO_4 sampai homogen untuk menarik air yang masih terdapat dalam sedimen. Setelah itu sampel diekstrak ke dalam dimetilen chlorida dengan menggunakan soxlet selama 8 jam. Proses selanjutnya sama seperti prosedur dengan menggunakan sampel air.

Perhitungan :

$$\text{Kadar contoh} = Tpc/Tps \times kc \times 1000 \times 1/bc$$

Keterangan:

Tpc = tinggi peak contoh

Tps = tinggi peak standard

Kc = konsentrasi contoh

Bc = berat contoh

Analisis Data

Indeks keanekaragaman dan keseragaman dihitung dengan menggunakan

$$H = - \sum_{i=1}^s (pi)(\log 2 pi)$$

rumus:

a. Nilai Indeks Keanekaragaman (Shanon dan Weaver, 1949 dalam Krebs, 1985) :


H = Indek diversity

S = jumlah spesies

pi = perbandingan jumlah spesies .i (ni) terhadap jumlah semua spesies (N) = (ni/N)

b. Nilai indeks keseragaman (Krebs, 1985) :

$$E = \frac{H}{H \max}$$



Gambar 1. Lokasi penelitian dan 3 lokasi stasiun sampling

E = Indeks kesamaan = Equitability
H = Indeks diversity yang diamaty
H max = Maksimum spesies diversity ($\log_2 S$)

Keterangan : Y = variabel dependent
X = variabel independent (residu organoklorin)

a = intersep; b = koefisien regresi

Untuk mengetahui korelasi antara residu organoklorin dan indeks keanekaragaman digunakan analisa regresi sederhana dengan program Minitab 10.

Persamaan matematis: $Y = a + b.X$

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa jumlah makrobenthos, keanekaragaman dan kesamaan jenis dapat dilihat dalam Tabel 1. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa jumlah hewan makro benthos terbanyak terdapat pada stasiun II sebesar 364 ind/ m², kemudian stasiun I sebesar 184 ind/ m² dan stasiun III sebesar 152 ind/ m². Sedangkan kalau dilihat dari indeks keanekaragaman terbesar terdapat pada stasiun III sebesar 2,806 kemudian diikuti oleh stasiun I sebesar 2,698 dan terkecil pada stasiun II sebesar 1,831. Kandungan pestisida dalam perairan Mlonggo dapat dilihat dalam Tabel 2. Dalam tabel tersebut terlihat kandungan terkecil masing masing jenis pestisida terdapat pada stasiun III baik dalam air maupun sedimen sedangkan yang paling besar terdapat dalam stasiun II.

Bila dilihat dari kondisi perairan pantai Mlonggo yang terdapat pada dasar perairan terlihat bahwa salinitas terendah rata rata terdapat pada stasiun I (27,1 ‰) dan tertinggi pada stasiun III (32,7 ‰) dan kandungan bahan organik tertinggi terdapat pada stasiun I (12,665%) dan terendah terdapat pada stasiun II (9,68%). Hasil uji regresi terhadap pp-DDT dalam sedimen terhadap keanekaragaman hewan makrobenthos pada masing masing stasiun menunjukkan bahwa pada stasiun I $r^2 = 0,88$ dan untuk stasiun II nilai $r^2 = 0,67$ sedang untuk stasiun III nilai $r^2 = 0,94$.

Pembahasan

Hasil penelitian keanekaragaman hewan makro benthos di perairan Mlonggo menunjukkan bahwa keanekaragaman tertinggi terdapat pada stasiun III (2,806) kemudian diikuti pada stasiun I (2,698) dan terendah pada stasiun II (1,831). Kondisi tersebut sebenearnya dapat dipahami karena pada stasiun kondisi dasar perairannya lebih baik bila dibandingkan dengan stasiun II dimana pada stasiun III kandungan pestisidanya paling rendah bila dibandingkan dengan stasiun II maupun stasiun I. Karena seperti kita ketahui pestisida merupakan unsur hidrokarbon yang toksik yang dapat terakumulasi dalam jaringan organisme. Keberadaan pestisida dalam perairan laut umumnya terbawa oleh aliran sungai dan dari atmosfer yang jatuh bersamaan dengan hujan dan sebagian besar disumbangkan dari aktifitas pertanian (Clark, 1989). Seperti kita ketahui daerah sekitar perairan Mlonggo merupakan daerah persawahan sehingga diduga masuknya pestisida dapat langsung melalui aliran sungai dan terakumulasi dalam sedimen perairan tersebut hal tersebut bias dilihat dengan tingginya untuk semua jenis pestisida pada stasiun II bila dibandingkan dengan yang terdapat pada stasiun I dan III. Tingginya kandungan pestisida dalam sedimen tentunya akan berdampak pada organisme yang ada didalamnya seperti hewan makrobenthos, hal ini tercermin dengan rendahnya nilai indeks keanekaragaman yang ada pada stasiun II bila dibandingkan dengan stasiun I dan III. Beberapa penelitian pengaruh bahan pestisida

terhadap organisme laut telah diinformasikan seperti yang dikemukakan oleh Brown (1978) yang menginformasikan bahwa pestisida organoklorin dalam konsentrasi yang sangat rendah dapat menekan pertumbuhan makrozoobenthos. Lebih lanjut Brown (1978) melaporkan bahwa dalam suatu perairan yang tercemar DDT 1 ppm, pertumbuhan *Crassostrea virginica* tereduksi sebesar 95 % hanya dalam waktu satu minggu. Demikian pula pada oyster, meskipun dapat tumbuh normal pada konsentrasi 10 ppb, namun pembentukan cangkang dapat terhambat. Pada konsentrasi 0,1 ppb DDT dapat mereduksi pembentukan cangkang sekitar 80%. Eisler (1969, dalam Ungerer *et al.* 1978) mengatakan bahwa pestisida organoklorin dapat menghambat produktivitas fitoplankton, membunuh crustacea, ikan dan moluska. Dari informasi tersebut terlihat dengan jelas bahwa pestisida sangat memberi dampak yang sangat buruk bagi organisme perairan terlebih lebih ditambah dengan rendahnya kandungan bahan organik sebagai bahan makanan untuk hewan makro benthos pada stasiun II bila dibandingkan dengan stasiun I dan II. Sebenarnya diversitas hewan makro benthos di suatu perairan tidak hanya tergantung oleh satu faktor seperti pestisida namun banyak faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal seperti

sifat reproduksi, adaptasi dan dispersi jauh karena faktor eksternal seperti polutan, migrasi, pemangsaan dan kompetisi. Jadi memang sangat tidak mungkin menyatakan eksistensi suatu populasi dalam suatu habitat hanya disebabkan oleh satu faktor eksternal, masih sangat diperlukan beberapa penelitian yang mendalam secara laboratorium untuk mengetahui efek pestisida terhadap hewan makrobenthos.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hewan makro benthos yang terdapat di perairan Mlonggo sementara dapat dikatakan dipengaruhi oleh pestisida yang terdapat dalam perairan baik sedimen maupun air

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan atas pendanaan penelitain Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Tinjauan Pustaka

Brown, A.W.A. 1978. *Ecological pesticides*. John Willey and Sons. New York. 127 p

Clark, R.B. 1989. *Marine pollution*. Oxford Science Publications. Oxford. 220 p.

Djamin, A. 1983. *Pesticide Management in plantation in North Sumatra*. A peper

- presented in regional symposium on plantation environments, Indonesia.*
- Djayanto, W. 1985. *Chemical are 'no problem' in Indonesia.* Jakarta Post, Nov 7.
- Eltringham, S.K. 1971. *Life inmud and sand.* Crane, New York, 39 – 55 pp.
- Glynn, P.W., Howard, L.S., Corcoran, E and Freay, A. D. 1985. *Preliminary investigations into the occurrence and toxicity of commercial herbicide formulations in reef building corals.* Proc. Int. Coral Reef, 1985.
- Hamidah, R. 1991. *Khromatografi gas untuk penentuan organoklorin dari poliklorobifenil.* LON _ LIPI. Jakarta. 41 – 45 hal.
- Krebs, C.J. 1985. *Ecology : The experimental analysis of distribution and abundance.* Harper & Row Publishers, New York. 800 p.
- Noegrohati, 1993. *Petunjuk laboratorium analisis petisida organoklorin.* Gajah Mada Press. 285 hal.
- Odum, E.P. 1971. *Fundamental of ecology.* W.B Saunders Company. Toronto. 547 p.
- Robert, D., Kastoro, W.W and Somodihardjo, S. 1982. *Shallow water marine mollusks of North West Java.* Lon-LIPI. Jakarta. 140 pp.